

Behandlingsmål Hjerte	LDL	Blodtryk
Raske - Heartscore \geq 5% - Totalkolesterol $>$ 8** - LDL $>$ 5 - Systolisk $>$ 155 mmHg	Heartscore: \geq5 og \leq10%: - LDL $<$ 3,0	< 80 år: - $<$ 135/85 (hj.BT) - $<$ 140/90 (kons.BT)
	Heartscore: $>$10%: - LDL $<$ 2,5	\geq 80 år: - systolisk $<$ 145 (hj.BT) - systolisk $<$ 150 (kons.BT)
Diabetes	Uanset varighed af diabetes: - LDL \leq 2,5**	Ældre, varighed af diabetes høj: - $<$ 140/85 (kons.BT) Yngre, mikro/makroalb.: - $<$ 130/80 mmHg (kons.BT)
	Diabetes Højrisiko: - Mikroalbuminuri - Hypertension - Rygning - Arvelig hjertekarsygdom i familien	Uanset varighed af diabetes: - LDL $<$ 1,8*
Diabetes og hjertekar-sygdom§	Uanset varighed af diabetes: - LDL $<$ 1,8*	$<$ 140/90 PAD+ Diabetes: $<$ 130/80
Hjertekarsygdom§	AMI: LDL $<$ 1,4* PAD: LDL $<$ 1,8* Apopleksi: LDL $<$ 1,8*	AMI: $<$ 140/90 mmHg PAD: $<$ 135/85 mmHg (hj.BT) Apopleksi: $<$ 140/90 mmHg
Kronisk nyresygdom eller Familiær hyperkolesterolæmi	- LDL $<$ 2,5	Nyresyge: - $<$ 130/80 (makroalb. eller eGFR $<$ 30 ml/min) - $<$ 135/80 (mikroalb. eller ingen albuminuri)

* Eller 50% reduktion i LDL ** Eller 50% reduktion i LDL, hvis LDL er mellem 2,6-5,2

***Hvis totalkolesterol $>$ 8 mmol/mol (og LDL samtidigt er $>$ 4,9 mmol/mol) skal familiær hyperkolesterolæmi overvejes, herunder henvisning til lipidklinik.

§ Hjerte-kar-sygdom: En patient med en eller flere af følgende ICPC koder: **AMI**(K74, K75, K76), **Apopleksi** (K89, K90, K91), **PAD**(K92)