

Helicobacter Pylori-infektion

Følgende case har været udgangspunkt for diskussion og konklusion:

1. konsultation

39-årig mand fra Nigeria, som har været i Danmark i 14 måneder, henvender sig med smerter i toppen af epigastriet i forbindelse med fødeindtag. I øvrigt rask uden kroniske sygdomme, ingen synkeproblemer eller nedre mavesmerter, stabil vægt, normal afføring. Ingen fast medicin, ikke-ryger, drikker ikke alkohol. Patienten henvises til Helicobacter Pylori breath-test, som er positiv.

2. konsultation

Patienten kommer til opfølgende konsultation med svar på prøven, og eradikationsbehandling påbegyndes.

Konklusion

- Ved 1. konsultation anvendes koden ”**D02 Smerte i epigastriet**”
- Ved 2. konsultation anvendes koden ”**D87 Mavekatar – Helicobacter-positiv**”

Bemærkninger:

I ICPC-baggrundsgruppens diskussion var der forskellige forslag til, hvordan 2. konsultation skulle kodes. Den omtalte case blev derfor forelagt WICC, og på basis af svarene herfra er konklusionen blevet som anført. Reelt kan vi ikke vide, om patienten har gastritis eller en anden gastrointestinal tilstand. Men betragtningen er, at når vi behandler den påviste Helicobacter-infektion, så er patientens symptomer sandsynligvis udtryk for en specifik lidelse. Og her vælges D87 som det mest sandsynlige (i forhold til ”D85 Sår på tolvfingertarm” og ”D86 Mavesår IKA”).

April 2013, læge Erik Karstoft