

Et godt eksempel fra klyngerne

Rationel brug af antibiotika og fælles kommunale retningslinjer ved behandling af øjenbetændelse

KOOL klyngen, Kolding Kommune

Introduktion

Øjenbetændelse er udbredt blandt småbørn, og det kan være en udfordring for både forældre og pædagoger at afgøre, hvilken behandling barnet skal have, og om barnet må komme i institution eller ej. Forvirringen skyldes som regel mangel på viden om forskellen på viral og bakteriel infektion – og uklare retningslinjer for håndteringen af øjenbetændelsen.

Klyngens arbejde

KOOL klyngen i Kolding har arbejdet med KiAP's klyngepakke om øjenbetændelse "Klyngepakke om Conjunctivitis". Klyngen har derudover i samarbejde med Kolding Kommune fastsat ensartede regler og tydeliggjort dem for børnenes forældre. Dette kan skabe bedre klarhed over, hvornår børn må komme i daginstitution og sikre, at alle har viden om dette, og om hvornår der gives øjendråber.

Opfølgning / resultat af indsatsen

En af pointerne i klyngepakken er, at Chloramfenikol bør foretrækkes frem for Fucidinsyre, da der ikke er resistens over for Chloramfenicol, mens der er risiko for resistensudvikling over for Fucidinsyre. Klyngen havde emnet på klyngemøde sidst i februar, og som det ses af grafen, er det på få måneder lykket klyngen at ændre udskrivningsmønsteret i den ønskede retning.




KOOL klyngen

Kolding, Region Syddanmark

62 læger og
94.000 patienter
i klyngen

Samarbejde med kommunen
om øjenbetændelse



Udover at anvende og implementere ensartede retningslinjer for behandling af øjenbetændelse har klyngen i samarbejde med Kolding Kommunes daginstitutioner udarbejdet en fælleskommunal instruks vedrørende behandlingen af øjenbetændelse.

I figuren til venstre ses udviklingen i brug af chloramfenikol og fucidinsyre fra januar til juli. KOOL klyngen afholdt klyngemødet i slutningen af februar måned.

Kvalitetsarbejdet har nu foregået i klyngeregi i så lang tid, at der i flere tilfælde er begyndt at komme målbare resultater ud af arbejdet. Her kan du læse eksempler på de resultater, klyngearbejdet har medført rundt om i landet.

Instruks for behandling af øjenbetændelse i Kolding kommune

Børn med øjenbetændelse der må komme i institutionen:

- Langt de fleste tilfælde af øjenbetændelse er virus og kræver ikke behandling.
- Ofte ses let rødme og gule klatter i øjnene især efter søvn.
- Disse børn må komme i institution og skal ikke ses af læge.

Børn med øjenbetændelse der skal ses af læge:

- Hvis der er stærkt pusflåd fra øjet.
- Hvis der er tydelig lysskyhed.
- Hvis der er påvirket almentilstand eller feber.
- Børn der behandles med antibiotika, må efter 2 døgn og symptomfrihed igen komme i institution.

Behandling af øjenbetændelse:

Chloramfenikol foretrækkes frem for fucidinsyre grundet resistens mod fucidinsyre.

Kolding og Omegns Lægeklynge